

738 - BUSCA ATIVA E PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO E DERMATITE ASSOCIADA À INCONTINÊNCIA NA PEDIATRIA

Tipo: POSTER

Autores: ANA ROSA BRAGA DE SOUZA (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ), MADNA AVELINO SILVA (HIAS), JOANA DA SILVA ASSUNÇÃO (HIAS), MARA MILVIA PONTES MELO RESENDE (HIAS), LUANA ARIELY BRAGA MOREIRA (HIAS), RAIMUNDO AUGUSTO MARTINS TORRES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ), VANESSA ALMEIDA PINHO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ), SILVANA MARTINS PARENTE (HIAS)

INTRODUÇÃO: A Dermatite Associada à Incontinência surge do contato prolongado da pele na região perineal com urina, fezes, umidade e fricção, que são os principais fatores que a desencadeiam(1). As Lesões por Pressão são danos localizados na pele e/ou nos tecidos mais profundos, geralmente em áreas sobre proeminências ósseas ou uso de dispositivos médicos. Elas são comuns em pessoas com sensibilidade reduzida ou em desenvolvimento, como em pacientes pediátricos, e são influenciadas por fatores internos e externos(2,3). É importante destacar que essas complicações são eventos adversos que podem acometer pacientes pediátricos durante a internação hospitalar(4). A equipe de saúde pode adotar medidas preventivas para evitar esses agravos. **OBJETIVO:** Descrever a experiência da busca ativa de LP e DAI. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado no segundo trimestre de 2025, em Fortaleza - Ceará, em um Hospital Infantil de referência em Fortaleza no Ceará, no Serviço Especializado em Estomaterapia. O serviço é composto por dez enfermeiros, estomaterapeutas e/ou dermatológicos e por uma técnica de enfermagem. O relato tem como característica principal a descrição das ações realizadas, este é um tipo de produção de conhecimento, cujo texto apresenta uma vivência profissional. **RESULTADO:** O enfermeiro realizava visita observando o paciente à beira leito, conversando com genitores e acompanhantes dos pacientes pediátricos, sobre presença de lesões e/ou dermatites, no momento. O enfermeiro utilizou durante a busca uma planilha impressa, desenvolvida pelo próprio serviço. Com as informações divididas em cinco itens: 1)Dados gerais do paciente; 2)Informação sobre a avaliação de risco para desenvolver LP(Escala de Braden); 3)Medidas preventivas básicas, adaptadas do protocolo do Ministério da Saúde(4), com os itens: Nutrição e hidratação adequadas; Avaliação de pele diária; Manutenção da pele limpa, seca e hidratada; Utilização de sabonete levemente ácido; Cuidados para prevenção dermatite; Cuidados com punção venosa; Monitoração quanto a MARS; Proteção de área de risco; Aplicação de superfície de apoio(colchão piramidal, viscoelástico, pneumático); Mudança de decúbito; 4)Presença de DAI, com categorização conforme Ghent Global IAD Categorization Tool(5) e 5)Presença de LP, com classificação conforme National Pressure Injury Advisory Panel (NPIAP)(3). O momento da busca ativa serviu para praticar educação em saúde sobre: importância da hidratação da pele, mudança de decúbito, cuidados com ostomias, frequência da troca de fraldas, utilização de protetor cutâneo, entre outros. Por fim, o enfermeiro da busca ativa, comunica o responsável pela unidade quanto os achados. Os dados colhidos na busca servem para os indicadores da qualidade da assistência prestada. **CONCLUSÃO:** A detecção precoce de LP e DAI através da busca ativa é importante para identificação e intervenção terapêutica oportuna em pacientes pediátricos. Essa abordagem contribui para o manejo dessas complicações e permite avaliação e aprimoramento das práticas assistenciais dos enfermeiros nas unidades de internação. Dessa forma, a implementação de uma estratégia proativa assegura a prevenção e a otimização dos resultados clínicos, elevando a segurança do paciente. Consequentemente, promove-se um ambiente de cuidado de excelência, com a minimização dos riscos de agravos durante o período de internação.